

MESSAGE TECHNIQUE DU JEUDI 28 AVRIL 2011

Pour vous faciliter la lecture de nos messages, **les nouveautés sont inscrites en rouge** dans le texte.

RESUME

Blés: deux nœuds à apparition de la dernière feuille
Fumure : le troisième avant les précipitations
Désherbage : Les derniers rattrapages sont encore possibles

Lin de printemps: 10 centimètres et plus
Fin de la période des désherbages, attention aux chénopodes

Pois protéagineux d'hiver: en début de floraison
Application fongicide déconseillée pour le moment

Tournesol :en cours de levée
Effarouchement des corneilles nécessaire

Maïs et soja semis en cours

METEO

Les précipitations annoncées pour jeudi soir et vendredi se confirment.

LIN DE PRINTEMPS

Les lins atteignent 10 centimètres et plus ce qui rend l'utilisation du Speleo caduque.
Avec les conditions de bise et le temps sec persistant, l'efficacité des sulfonilurées vis-à-vis des chénopodes est assez aléatoire.
On hésitera pas de refaire un split avec 50g/ha de Concert SX pour renforcer l'efficacité.

POIS PROTEAGINEUX D'HIVER

Les pois sont en début de floraison

Avec la sécheresse, le capital rendement des pois se réduit progressivement. L'intervention avec un fongicide se justifie de moins en moins pour le moment.

TOURNESOL

Les tournesols déjà levés ou en cours de levée sont particulièrement sensibles au dégâts d'oiseaux (corneilles, pigeons,...) et aux dégâts de lièvres. Il est possible de réduire les dégâts de corneille par l'effarouchement avec des individus pendus ou disposés en hauteur dans les champs. Des corneilles congelées sont disponibles sur demandes auprès des gardes-faunes.

BLES D'AUTOMNE

Les blés se situent entre le 2^{ème} nœuds et la sortie de la dernière feuille

Fumure azotée

Avec les quelques précipitations annoncées, c'est le dernier moment pour appliquer le troisième apport pour les blés au stade de la dernière feuilles.

Pour les blés moins avancés, on profitera également de ces quelques litres pour incorporer le troisième apports.

Le fenêtre intervention se situe aujourd'hui jusqu'à 16h00 environ.

Désherbage FT 2.34.1 et suivantes

Seuls les produits pour les rattrapages tardifs sont encore utilisables (Biathlon, Express Max, Primus, Starane et consort, Starane XL). Vu les conditions sèches et défavorables pour l'action des sulfonylurées, on vous déconseille de lutter contre des gros gailllets à l'aide de l'Hoestar. Le Starane et consort ou Starane XL feront très bien l'affaire.

Céréales intensives

Maladies dans les blés (FT 2.53.3-4 et 2.59.1)

Après contrôle, on veillera à protéger la dernière feuille si cela s'avère nécessaire.

MAÏS

Les semis sont en cours, mais il est encore possible d'attendre des précipitations plus abondantes pour le semis.

Avec les conditions actuelles, on privilégiera les désherbages de postlevée foliaires.

SOJA

Les semis débutent, mais on peut encore attendre des précipitations plus abondantes pour le semis des sojas.

Pour les sojas déjà en place, on profitera des précipitations annoncées pour faire adhérer les désherbants racinaires. Une solution de postlevée est également disponible.

ECHEANCE PER ET CANTONALE

La date de retour pour les dossier PER et cantonaux est fixée au 4 mai.

RETOUR DES FORMULAIRES DU CAG

C'est le dernier délai pour retourner les formulaires de livraison des panifiables auprès du Cercle des Agriculteurs (Voir pièces jointe).

Fin du message, nous restons à disposition pour d'éventuelles questions ou remarques

Nicolas Courtois
022 939 03 14
courtois@agrigeneve.ch

Aurèle Jobin
022 939 03 15
jobin@agrigeneve.ch